


# UMWAGA ! HPAI

ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY  
GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY  
PTAKÓW (HPAI)



# INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU



W związku z zagrożeniem wystąpienia w Polsce

## WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW HODOWCY DROBIU

POWINNI ZACHOWYWAĆ  
SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ

I STOSOWAĆ ODPowiednie ŚRODKI BIOASEKURACJI

minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

1. Przetzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

## Hodowcy !!

**Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji!**

**(lekarz weterynarii prywatnej/praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta)**

**podjętą wystąpienia choroby zakaźnej drobiu**

**Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu**

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliz nóg i skrzydeł, niezdolność ruchów; duszność, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności